


令和6年 早期水稲栽培暦

JAおおいた南部エリア tel:0972-25-1231
大分県南部振興局 tel:0972-22-1195

月	3			4			5			6			7			8			9	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中



栽培上の注意点

播種 塩水選:うるち比重 1.13(塩:4.0kg/水:20L)
種子消毒:●テクリードC(50ml)+●スミチオン(10ml)/水:10L
播種:150~180g(催芽籾)/箱

田植 50株/坪
植付けは3~4本/株

中干し 5月下旬
茎数が1株20本程度確保できたら、田面に軽くヒビが入る程度に干す(ヒビの幅は約1cm以下)

出穂 赤丸部分の穂が「出穂」状態
ほ場の半分がこの状態なら「出穂期」

収穫 落水は収穫7日前
青籾は2割以下

施肥

一発肥料 ●苦土入りエムコート477 40kg/10a(90日タイプ) ●超一発DX 50kg/10a(80日タイプ) ※穂肥は散布しません

元肥 ●化成肥料10-16-16 30kg/10a

穂肥 ●化成肥料16-0-16 20kg/10a (16-0-16) ※出穂期の18~20日前

土づくりのために改良資材を投入しましょう

資材名	散布量(kg/10a)	特徴
珪鉄	100~200kg	鉄分・ケイ酸・苦土
ミネラルG		ケイ酸・鉄分・苦土
土改王	45~90kg	ケイ酸・カリ・苦土・リン酸

除草剤

初・中期発剤 ●エンペラー(1キロ粒剤・ジャンボ・豆つぶ) ※移植直後~ノビエ3葉期
●ポデーガードプロ(1キロ粒剤・ジャンボ・プロアブル) ※移植5日後~ノビエ3.5葉期

「ノビエ3.5葉期」は代かき後約2週間で到達することがあります。散布適期を逃さず早めに散布しましょう!

中後期剤 ●クリンチャーバスME ※イネ科・広葉雑草 ※移植後15日~ノビエ5葉期
●トドメMF(1kg・乳剤) ※イネ科雑草 ※移植後14日~ノビエ7葉期(粒剤は5葉期)
●クリンチャー(1kg・ジャンボ・液) ※イネ科雑草 ※剤形により効果の時期が異なります
●レプラス(1kg・ジャンボ) ※イネ科・広葉雑草 ※移植後14日~ノビエ4葉期

移植後の除草剤散布のポイント
7日間はかけ流ししない! 間断灌水
2~3日田面が出てても除草効果に影響なし
自然な減水

病害虫防除

箱施肥 ●ツインターボ箱粒剤08 ※いもち病、イネミズゾウムシ等 ※は種時(覆土前)~移植当日

防除① ●スクミノン ※1~4kg/10a

防除② ●リンバー粒剤 ※3~4kg/10a

穂摘い期防除 ●ビームエイトスタークルゾル ※収穫7日前まで ※いもち病、カメムシ類、ウンカ類等

カメムシ防除 ●キラップフロアブル・粉剤 ※収穫14日前まで ※カメムシ類、ウンカ類
●エクシードフロアブル・粉剤 ※収穫7日前まで ※カメムシ類、ウンカ類

いもち病 **イネミズゾウムシ** **スクミリンゴガイ** **イネ紋枯病** **穂首いもち** **ホソハリカメムシ** **クモヘリカメムシ** **トゲシラホシカメムシ** **イネカメムシ**

箱施肥散布のポイント
田植え3日前には散布しましょう。早めに散布すると、稲が有効成分を十分吸収し効果を発揮できます。また、1箱当り50gを均一に散布し、葉への付着分を培土へ払い落とした後、灌水して薬剤を培土へ落ち着かせましょう。