

令和6年産 水稻栽培ごよみ (早 期 コシヒカリ・ひとめぼれ)

JAおおいた東部営農経済センター 監修 大分県東部振興局 JA全農大分県本部

月	3月			4月			5月			6月			7月			8月		
	品種/旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
生育ステージ	コシヒカリ ひとめぼれ		元肥 田植期				中干し		穂肥 間断かん水		出穂期		出穂期		乳熟期		成熟期	
病害虫防除と予防		塩水選 スミチオン乳剤 テクリードCフロアブル	田植前日 イネドコロイムシ イネミスソウムシ コノメイガ ウンカ類 いもち病	防人箱粒剤	塩水選 スミチオン乳剤 テクリードCフロアブル	防人箱粒剤	かん水を保ち散布	防人箱粒剤	※カメムシ防除参照	穂揃い期まで	スタークル粉剤DL							
散布量 (10a当り)		1000倍 2000倍		1箱当り 50g				3~4kg			3~4kg	3kg	3kg	3kg	3kg	3kg	3kg	

除草剤の使い方																				
田植日数	初期除草剤使用禁止 (移植前6~1日)	田植	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
初期雑草処理	ラオウ ジャンボ フロアブル																			
中後期雑草処理	レプラス1キロ粒剤 レプラスジャンボ	クログワイ・ホタルイ・オモダカ・水田一年生雑草(移植後14日~60日) 粒剤: 1kg/10a ジャンボ400g/10a																		
	ウィードコア1キロ粒剤	クログワイ・コウキヤガラ・ホタルイ・水田一年生雑草(移植後7日~ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで) 1kg/10a ※効果発現まで1~2週間程度																		
	バサグラン液	水田一年生雑草・ホタルイ・ウリカワ 落水散布 移植後15日~55日 但し収穫50日前まで 500mlを100L/10a																		
	トドメバスマF液剤	水田一年生雑草・ホタルイ・オモダカ・ウリカワ 落水散布 移植後15日~ノビエ6葉期 但し収穫50日前まで 1000mlを100L/10a																		

施肥基準(10アール当り)			
項目	土づくり肥料	元 肥	穂 肥
一般田		化成肥料14-14-14 (25kg)	化成肥料16-0-16 (20kg)
砂質田	粒状ミネガード (80kg)	化成肥料14-14-14 (30kg)	
		エムコート2000(早生) (30kg~40kg)	不要

農薬使用の基本ルールを守りましょう!

- 農薬を使う前には、作物、使用方法を必ず確認しましょう!
・農薬ラベル確認、使用量・希釈倍数等
- 防除記録は、必ず残しましょう!
・農薬名、散布日、使用量、濃度、収穫前日数
- 対象作物以外に農薬が飛散・流出しないようにしましょう!
・周辺圃場の生産者との連絡、風がない時を選んで、ノズル等のこまめな調整
- 農薬使用後の管理もしっかり確認しましょう!
・器具の洗浄、空容器や不要農薬の適正処理、保管庫の施錠等
- 生産者の安全は、自ら実践で!
・十分な睡眠、不浸透性防除衣、手袋、農業用マスク、保護眼鏡、長靴、帽子の着用等

基本技術と増収のポイント

- 1株の植付本数を3~4本植とし田植後10日間は深水で管理する。
- 田植後10日すぎ頃から断間かん水とし、遅くとも中干し前までに溝切りする。
- 落水期まで断間かん水を行う。
- 生育の前半は多少見劣りしても穂肥までは施肥しないこと。
- 穂肥は幼穂が1cm位の時に施用する。
- カメムシ防除の徹底。

塩水選・種子消毒

塩水選
(新しい卵で調べ)

粉枯細菌等の発生を防ぐため、塩水選・種子消毒は必ず行う。

種子消毒

※二剤混合を必ず行う粉、1斗(10kg程度)

- ①スミチオン乳剤
- ②テクリードCフロアブル

シンガレセン チュウ予防

- ③粉袋をよくゆすり、薬液が中心まで浸水するようにする。
- ④種子消毒の廃液は適切に処理すること。

倒伏防止策

※倒伏が心配される水田には、ビピフル粉、又は、ビピフルフロアブルを出穂10日~5日前までに散布する。

薬剤名	10a当り使用量
ビピフル粉	4kg
ビピフルフロアブル	通常散布 薬量75ml~100ml/液量50L~150L 少量散布 薬量75ml~100ml/液量25L~50L

カメムシ防除

イネカメムシは従来の斑点米カメムシより早期に田んぼに侵入する。そのため出穂期頃に圃場の確認を行い、イネカメムシがいたら早急に防除を行う。または、出穂前に予防的に粒剤散布を行う。

薬剤名	10a当り	注意事項
スタークル粉剤DL		出穂期に散布 ※収穫7日前まで
スタークル粒剤	3kg	出穂の一週間前に湛水散布 ※収穫7日前まで
キラップ粒剤		出穂の一週間前に湛水散布 ※収穫14日前まで

作業メモ	土づくり	種子消毒	播種日	元肥施用	箱苗施薬日	田 植	初期除草剤散布	中後期除草剤散布	病害虫防除	無人ヘリ散布	穂肥施用	出 穂	稲 刈
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

JAおおいた東部営農経済センター
農畜産課 0978-72-0617 経済課 0978-72-5151

国東配送センター 0978-72-1340 国見配送センター 0978-82-1250
武蔵配送センター 0978-68-1123 安岐配送センター 0978-67-1315
杵築配送センター 0978-63-4417 山香配送センター 0977-75-0470

◎農薬飛散防止対策として、安全な粒剤体系で実施しよう!
◎品質の向上と安定多収は土づくり肥料の投入から
◎米は全量農協へ