


# 令和6年度 水稻栽培暦(由布)

月	4		5		6		7		8		9		10	
旬	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下



※刈遅れにご注意ください

### 栽培のポイント

**播種**

- 塩水選：うるち比重 1.13(塩:4.0kg/水:20ℓ)
- 種子消毒は必ず実施する
- 播種：薄播き(150g(催芽籾)/箱)

**種子消毒**

- 薬剤での消毒(24時間浸漬)
- テクリードCフロアブル(水20ℓに100mℓ) ※もみ枯細菌、苗立枯、ばか苗、いもち
- +スミチオン乳剤(水20ℓに20mℓ) ※シンガレセンチュウ
- 温湯消毒(60℃10分)

**苗箱施薬(50g/箱)**

- 防人箱粒剤
  - ※播種時(覆土前)～移植当日
  - ※ウンカ類(長期残効)
  - いもち病等に効果あり
- スクラム箱粒剤
  - ※播種時(覆土前)～移植当日
  - ※ウンカ類(長期残効) 紋枯・いもち病等に効果あり

### 施肥

**一発肥料**

※施肥は、出来るだけ田植日近くに行う

苦土入りエムコート477(90日) ※早生用 hitomebore・natsuhonoka: 40kg/10a

苦土入りエムコート477(100日) ※中生用 hinohikari: 50kg/10a

エムコート2000早生(早生用) hitomebore・natsuhonoka: 25~30kg/10a (90日タイプ)

エムコート2000中生(中生用) hinohikari: 35~40kg/10a

**元肥**

化成肥料10-16-16

hitomebore・natsuhonoka: 30kg/10a、hinohikari: 40kg/10a

化成肥料12-18-14

hitomebore・natsuhonoka: 25kg/10a、hinohikari: 35kg/10a

**穂肥**

※出穂の20日前

化成肥料16-0-16

20kg/10a

土づくりのために改良資材を投入しましょう

改良資材名	散布量(10a当たり)	特徴
山香有機の華	500kg	牛ふん堆肥
ケイカル	200kg	ケイ酸・苦土
ミネラルG	200kg	ケイ酸・苦土・鉄分
とれ太郎	60kg	ケイ酸・苦土・リン酸
土改王	45~90kg	ケイ酸・苦土・リン酸・カリ
コメアップ	100kg	ケイ酸・リン酸・カリ

### 除草剤

**初期剤** (使用時期に注意! 散布後7日間は落水禁止)

- デルカット乳剤 ※植代時(移植4日前まで)
- ベクサーフロアブル ※移植前7日または移植後～ノビエ発生始期

**初中期一発剤** 薬剤抵抗性雑草の発生を防ぐため、できるだけ前年と異なる薬剤を選択しましょう。

- 流星(1キロ・ジャンボ・フロアブル) ※移植直後～ノビエ3葉期(1キロ剤・フロアブルは田植え同時処理可)
- サラブレッドKAI(1キロ剤・ジャンボ剤・フロアブル) ※移植直後～ノビエ2.5葉期(1キロ剤・フロアブルは田植え同時処理可)

- ジャスタ(1キロ剤・ジャンボ剤・フロアブル) ※移植直後～ノビエ3.5葉期(1キロ剤・フロアブルは田植え同時処理可)
- ウィングラン(1キロ剤・ジャンボ剤・フロアブル) ※移植直後～ノビエ2.5葉期(1キロ剤・フロアブルは田植え同時処理可)

**移植後の除草剤散布のポイント**

7日間は水を出し入れしない!

2~3日田面が出てても除草効果に影響なし

中後期剤

**イネ科雑草**

- トドメ MF(1キロ剤) ※移植後14日～ノビエ5葉期(但し収穫50日前まで) ※湛水散布
- トドメ MF(乳剤) ※移植後14日～ノビエ7葉期(但し収穫50日前まで) ※湛水または落水して散布

**広葉雑草**

- バサグラン粒剤 ※移植後15~55日(但し収穫60日前まで) ※落水またはごく浅く湛水して散布

**イネ科・広葉雑草**

- トドメバス MF(液剤) ※移植後15日～ノビエ6葉期(但し収穫50日前まで) ※落水またはごく浅く湛水して散布

### 病害虫防除

**いもち病防除**

- コラトップ粒剤5(3~4kg/10a)
  - ※葉いもち: 初発10日前～初発時
  - ※穂いもち: 出穂30日前～5日前まで
- ブラシン粉剤DL(3~4kg/10a)
  - ※内穎褐変病などにも効果(4kg散布時)
  - ※収穫7日前まで

**ジャンボタニシ対策**

- スクミノン(1~4kg/10a)
  - ※移植後被害発生前(収穫60日前まで)

**仕上げ防除**

- ビームエイトスタークルゾル(1,000倍希釈 水60~150ℓ/10a)
  - ※いもち病、カメムシ・ウンカ類
  - ツマグロヨコバイに効果
  - ※収穫7日前まで

**稲こうじ病防除**

- Zボルドー粉剤DL(3~4kg/10a)
  - ※出穂10日前まで
  - ※薬害を生じやすいので使用時期に注意してください
- モンガリット粒剤(3~4kg/10a)
  - ※収穫45日前まで
  - (主として紋枯病に高い効果)

**【作業日誌】**

項目	実施日	使用肥料・農薬・量など
種子消毒	月 日	
播種	月 日	
苗箱施薬	月 日	
土改材	月 日	
元肥	月 日	
田植え	月 日	
除草剤	月 日	
穂肥	月 日	
防除	月 日	
収穫	月 日	